

## VOEDER VOGELS IN DE WINTER.

Leg van half november tot half maart elke dag op hetzelfde tijdstip wat zaden in de voederhuisjes (zonnebloempitten, gierst ... maar geen mengsel). Zet ook een schoteltje met lauw water, zonder suiker of zout. Leg er een rooster met grote gaten op, zodat de vogels zich niet nat maken.

Geef ze ook regelmatig stukken appel of peer. Hang tevens wat ongezouten spekvet.

Kan je niet alle dagen voor eten zorgen? Weet dan dat





vogels in de (school)tuin insectenlarven en regenwormen uit de composthoop peuteren en granen of bessen pikken van kaardenbol, kliskruid, vlier, lijsterbes, klimop ...

Je kunt ook vetbollen maken. Daarmee lijden vogels minder honger en zijn ze beter bestand tegen de kou.

Smelt zelf eerst plantaardig bakvet. Voeg daar samen

met de leerlingen zonnebloempitten bij (of gierst, gerst, tarwe, haver, geplette maïs ..., maar slechts één soort per bol). Giet alles in een yoghurtpotje. Rol het eindje van een ijzerdraad op tot een spiraal en stop die in het vet. Haal het afgekoelde vet uit het potje en hang het op. Je kan ook slingers van ongepelde pindanootjes

maken door ze op een ijzerdraad te rijgen. Vergeet zeker niet de hele winter lang de slingers te vervangen.



Geef vanaf begin maart geleidelijk minder eten aan de vogels en hou er helemaal mee op vanaf half maart, of – indien het koud blijft – vanaf 1 april. Daarna is het niet meer nodig: veel vogels die in de winter zaden eten, schakelen weer over op insecten zodra de lente komt. Bovendien kunnen jonge vogeltjes in de pindaslingers verstrikt raken ... Maar zorg wel nog voor

water. Neem ook het waterbakje met rooster weg, zodra het niet meer vriest, en plaats een grotere schotel waarin de vogels kunnen baden. Die moet ondiep zijn, maar niet glad en zonder steile randen. Kies een model op voet of eentje om

op te hangen: er liggen altijd katten op de loer.

